




Maria baby strip

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

Maria Baby Strip является качественным *in vitro* диагностическим тестом, который предназначен для самостоятельного тестирования, чтобы определить период максимального выделения лутенизирующего гормона (ЛГ), а также возможного начала Вашей овуляции. Применять только для *in vitro* диагностики. Только для наружного применения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Количество находящегося в моче здоровой женщины лутенизирующего гормона (ЛГ) в середине менструального цикла резко увеличивается. Увеличение количества ЛГ свидетельствует об овуляции – процессе выхода зрелой яйцеклетки из яичников. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что ЛГ тестирование помогает точно определить начало овуляции. В норме овуляция должна произойти через 24–48 часов после получения положительного результата на тест. Попадая на абсорбент теста, пробы мочи в результате капиллярного действия перемещаются по мемbrane. Когда находящийся в пробе ЛГ достигает тестовую зону мембранны, он образует цветную полоску. Отсутствие цветной полоски означает, что результат отрицательный. Если тест – полоска проведен правильно – цветная полоска появится и в контрольной зоне. Тест – полоска с высокой точностью определяет начало овуляции и является ценным инструментом, так как помогает вычислить оптимальный период для слияния сперматозоида и яйцеклетки. В силу разных обстоятельств, эмоций и других жизненных аспектов овуляция может быть нерегулярной. Вы не можете рассчитывать на то, что овуляция всегда произойдет в одно и то же время после менструации, поэтому этот тест-полоска должен проводиться повторно во время каждого менструального цикла.



В СОСТАВ ТЕСТ-КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

1. Упаковочный мешочек с одной тестовой полоской и пакетик с абсорбентом. Абсорбент предназначен исключительно для хранения и не используется для тестовых процедур.
2. Инструкция по применению.

ЧТО ВАМ ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ?

1. Чистая, сухая пластмассовая или стеклянная емкость для мочи.
2. Таймер (ручные или настенные часы).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Комплект *Maria Baby Strip* предназначен только для наружного применения. Не глотать.
2. Выбросить после первого использования. Тест для мочи можно использовать только один раз.
3. Не использовать тест-комплект с истекшим сроком годности.
4. Не использовать комплект, если мешочек проколот или плохо запечатан.
5. Хранить в недоступном для детей месте.
6. Использованный тест-комплект следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

1. Хранить в запечатанном виде при температуре 4°C – 30°C до окончания срока годности, указанного на упаковке.
2. Беречь от попадания прямых солнечных лучей, влаги и нагрева.
3. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ.
4. Тест следует использовать сразу после вскрытия упаковки.

ЗАБОР ОБРАЗЦА И ПОДГОТОВКА

КОГДА СОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ МОЧИ ДЛЯ ТЕСТА?

Для тестирования подходит любой образец мочи.

КАК СОБРАТЬ МОЧУ?

Соберите образец мочи в любую чистую и сухую пластмассовую или стеклянную тару.

КОГДА НАЧИНАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ?

Продолжительность менструального цикла – это временный промежуток с первого дня менструального кровотечения до дня перед началом следующей менструации. Перед тестированием определите продолжительность менструального цикла. Для определения времени, чтобы начать тест, пожалуйста, смотрите указанную ниже схему. Если ваш цикл короче, чем 21 день, или дольше, чем 38 дней, пожалуйста, свяжитесь с вашим врачом. Если вы не знаете продолжительность вашего цикла, вы можете начать тест через 11 дней после первого периода, так как средняя длина цикла составляет 28 дней. Сделайте 1 тест в день пятидневного периода, или, когда заметите резкое увеличение количества ЛГ.

СХЕМА ЦИКЛА

время цикла	день цикла, когда начать тестирование	время цикла	день цикла, когда начать тестирование
21 день	5. день	31 день	15. день
22 дня	6. день	32 дня	16. день
23 дня	7. день	33 дня	17. день
24 дня	8. день	34 дня	18. день
25 дней	9. день	35 дней	19. день
26 дней	10. день	36 дней	20. день
27 дней	11. день	37 дней	21. день
28 дней	12. день	38 дней	22. день
29 дней	13. день	39 дней	23. день
30 дней	14. день	40 дней	24. день

Пример: Если ваш цикл длится двадцать шесть дней, то согласно таблице тестирование необходимо начинать на 10-ый день. В календаре ниже показано, как определить 10-ый день.

ОБРАЗЕЦ КАЛЕНДАРЯ

1	2	3 + 1. день	4	5	6	7
8	9	10	11	12 # 10. день	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

3+ = Первый день менструального кровотечения

12# = День для начала теста (10-ый день)

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Перед процедурой тестирования тестовую полоску и мочу хранить при комнатной температуре.
2. Извлеките тестовую полоску из закрытой упаковки.
3. Погрузите тестовую полоску в образец мочи таким образом, чтобы стрелка указывала на образец мочи. Через 3 секунды выпустите тестовую полоску и поместите ее на чистую, сухую и невпитывающую поверхность (напр. на отверстие емкости образца мочи). **ВАЖНО!** Уровень образца не должен заходить за отметку MAX, в противном случае тест будет неверным.
4. Подождите 5 минут и потом прочтите результат. **Результат проверяйте ровно через 5 минут после процедуры тестирования и не позднее!**



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Негативный результат (нет резкого увеличения количества ЛГ в моче):

- 1) в контрольной зоне появилась только одна полоска;
- 2) линия появилась в тестовой зоне, но она светлая, чем контрольная линия.

Позитивный результат (резкое увеличение количества ЛГ в моче): если видны две цветовые полоски и тестовая полоска такого же цвета, как контрольная полоска, или темнее – очищается, что в течение ближайших 24–48 часов начнется овуляция. Если вы пытаетесь забеременеть, лучшее время для полового акта это 24 часа (но не позднее, чем 48 часов) после положительного результата теста.

Недействительный результат: после процедуры тестирования в контрольной зоне нет видимой полоски или полоски вообще нет ни в одной из зон. Повторите процедуру, используя новый комплект теста. Если результат теста все еще недействительный, свяжитесь с рас пространителем, укажите номер серии.

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА

1. Тест действует только в случае точного соблюдения инструкций
2. Этот тест не следует использовать для контрацепции.
3. Если у вас цикл нерегулярен или необычно долгий, проконсультируйтесь с врачом.
4. Этот тест является качественным скринингом. Он не предназначен для определения количественной концентрации ЛГ.
5. Устройство подходит только для анализа мочи человека.
6. Нечистый образец или мешающие вещества в моче могут привести к ложному результату.
7. Некоторые препараты для лечения бесплодия, такие как 17-β-эстрадиол, прогестерон и эстрадиол валерат, могут вызывать ложные результаты.
8. Нечистое тестовое устройство может привести к ложному результату.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЧНОСТЬ

429 образцов мочи были протестированы с помощью одноступенного теста мочи Wondfo и юридически проданного теста в клинической референс-лаборатории. Корреляция между одноступенным анализом мочи Wondfo и рыночным тестом составила 99,8%. 4. Согласие положительного с рыночным тестом: 99,3% (144/145). Согласие негатива с рыночным тестом: 100% (284/284). Общее соглашение с рыночным тестом: 99,8% (428/429)

Чувствительность и точность теста

Maria Baby Strip тест для определения овуляции определяет концентрацию LH в моче – 25mIU/mL или больше. Тест был откалиброван W.H.O. Стандарт (2-й международный стандарт ВОЗ (IS) 80/552). Никакой перекрестной реакции не появляется, когда в образце присутствует hFSH (200 ММЕ / мл) или hTSH (250 ММЕ / л)

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Есть большая цветовая разница между контрольными полосками двух тестов. Это по вине для беспокойства? Нет. Цветовая разница контрольной полоски не влияет на результат теста.

2. Можно ли результат тестирования прочесть после истечения 5 минут? Нет. Результаты теста необходимо считывать ровно через 5 минут после тестирования. Хотя положительный результат, как правило, не меняется в течение нескольких дней, отрицательный результат может измениться на ошибочно положительный по истечении пяти минут после тестового периода, в результате чего измерение может быть некорректным. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, всегда рекомендуется прочесть результат теста на 5-й минуте после процедуры тестирования и потом тест выбросить.

3. Как долго мне продолжать делать тест *Maria Baby Strip*? Хотя бы 5 дней, или до наблюдаемого резкого увеличения ЛГ.

4. Розовый фон и вертикальные штрихи появились в зоне результата в течение периода тестирования. Является ли это поводом для беспокойства? Нет. Каждый образец мочи отличается по своему химическому составу, а также он зависит от влажности воздуха в зоне (помещении) проведения теста. Такие изменения физических условий могут вызвать вертикальные штрихи и/или розовый фон, но это не влияет на результаты теста.

5. Алкоголь и лекарства могут повлиять на результат теста? Нет. Однако, если вы принимаете какие-либо лекарства, вы должны проконсультироваться с врачом.

6. Когда самое подходящее время для полового акта после получения положительного результата теста? Овуляция должна начаться в течение 24–48 часов. Это время наиболее плодородное. Поэтому половой акт рекомендуется именно в это время.

7. В настоящее время я использую метод базальной температуры тела (BBT). Заменяет ли этот тест BBT? Повышенная базальная температура тела прежде всего показывает, что овуляция уже произошла. *Maria Baby Strip* тест показывает, когда овуляция может произойти.

8. Результат теста был положительным и в течение 24–48 часов у меня был половой акт. Но беременность не наступила. Что мне делать? На наступление беременности может повлиять ряд факторов. В некоторых случаях *Maria Baby Strip* тесты надо использовать 3–4 месяца. Если беременность в течение 3–4 месяцев не наступила, обратитесь к врачу вместе со своим партнером.

9. Может ли на результат повлиять потребление жидкости? Примерно два часа до забора образца мочи, мы рекомендуем ограничить прием жидкости. Это потому, что повышенное потребление жидкости перед тестированием разбавит количество гормонов в моче.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Sievert LL, Dubois CA. "Validating signals of ovulation: Do women who think they know, really know?" Department of Anthropology, Machmer Hall, UMass Amherst, Amherst, Massachusetts. Am J Hum Biol. 2005 Apr 22;17(3):310-320

2. Ruiz Anguas J, Carballo Mondragon E, Anta Jaen E, Diaz Calvillo J, Kably Ambe A. "Usefulness of luteinizing hormone levels to determine the oocyte quality" Ginecol Obstet Mex. 2005 Jan; 73:28-35

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ

	Беречь от солнечных лучей
	Хранить при температуре 4°C-30°C
	Не использовать повторно

Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No. 8, Lizishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, Китай.

Уполномоченный представитель в ЕС: Qarad b.v.b.a., Cipalstraat 3, B-2440 GEEL, Бельгия.

Распространитель: ООО Elvim, Курземес проспект 36, Рига, Латвия. Тел.: +371 67 808440. www.marialine.lv

REF W2-S

Ревизионный номер MBS 02.2020






Maria baby strip

OVULĀCIJAS TESTS

Maria Baby Strip ir kvalitatīvs diagnostikas tests, kas paredzēts pārtestēšanai, lai noteiktu, kad ir luteinīzējoša hormona (LH) izdalīšanās maksimums, kā arī to, kad Jums varētu būt ovulācija. Lietošanai tikai *in vitro* diagnostikai. Tikai ārīgai lietošanai.

KĀ TAS DARBOJAS?

Auglīgu sieviešu menstruālā cikla vidū urīnā esošā luteinīzējoša hormona (LH) daudzums palielinās. LH izraisa ovulāciju, kuras laikā no auglīgas sievietes organismā periodiski tiek izvadītas olšūnas. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) eksperti norāda, ka LH tests ir uzticams veids, kā noteikt ovulāciju. Ovulācija parasti notiek 24-48 stundu laikā pēc pozitīva testa rezultāta. Kad testa strēmeli tiek iemērķoti urīna paraugā, kapilārās darbības rezultātā paraugs pārvietojas pa membrānu. Kad LH paraugā sasniedz membrānas testa zonas apvidu, uz tā parādās krāsu līnija. Ja šādas krāsu līnijas nav, tas norāda par negatīvu rezultātu. Testa strēmeli nosaka ovulāciju ar augstu precizitātes pakāpi. Ar tās palīdzību var noteikt laiku, kad ir vislabākās nosacījumi olšūnas un spermas ūnīšanas saplūšanai. Dažādu apstākļu, emociju un citu faktoru dēļ ovulācija mēdz būt neregulāra. Nedrīkst pieņemt, ka ovulācija vienmēr notiks vienā un tajā pašā laikā pēc menstruācijas. Tāpēc katrā menstruālā cikla laikā jums jāveic atkārtots tests.



TESTA KOMPLEKTA SATURS:

- Viena iepakojuma maisiņš ar vienu testa strēmeli un mitruma uzsūcēju. Mitruma uzsūcējs ir paredzēts tikai un vienīgi uzglabāšanai un netiek izmantots testa procedūrām.
- Lietošanas instrukcija.

KAS VĒL JUMS IR NEPIEIEŠAMS?

- Tīrs, sauss plastmasas vai stikla trauks urīna savākšanai.
- Taimeris (rokas vai sienas pulkstenis)

PIESARDZĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Komplekts paredzēts tikai ārīgai lietošanai. Nenorīt.
- Izmest pēc pirmās lietošanas. Urīna testa strēmeli var izmantot tikai vienu reizi.
- Nelietot testa komplektu, kuram ir beidzies derīguma termiņš.
- Nelietot testa komplektu, ja maisiņš ir pārdurts vai nav rūpīgi noslēgts.
- Uzglabāt bēriņiem nepieejamā vietā.
- Izlietotais testa komplekts jāiznīcina atbilstoši vietējiem noteikumiem.

UZGLĀBĀŠANA UN DROŠĪBA

- Uzglabāt 4°C - 30°C temperatūrā neatvērtā iepakojumā līdz tā derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
- Sārgāt no tiešas saules gaismas, mitruma un karstuma iedarbības.
- NESASALDĒT!
- Iepakojumu ieteicams atvērt tieši pirms testa veikšanas.

PARAUGA SAVĀKŠANA UN SAGATAVOŠANA

KAD SAVĀKT MARIA BABY STRIP URĪNA PARAUGU TESTAM?

Testa veikšanai derēs jebkāds urīna paraugs.

KĀ SAVĀKT URĪNU?

Savāciet urīna paraugu jebkurā tīrā, sausā plastmasas vai stikla traukā.

KAD SĀKT TESTU

Menstruālā cikla ilgums ir laika posms no pirmās menstruālās asiņošanas dienas līdz dienai pirms nākamās asiņošanas sākšanās. Pirms testa veikšanas, nosakiet menstruālā cikla ilgumu. Lai noteiktu laiku, kad sākt testu, lūdzu, skatiet tālāk tekstā attēloto diagrammu. Ja jūsu cikls ir īsāks par 21 dienu, vai garāks par 38 dienām, lūdzu, konsultējieties ar ārstu. Ja nezināt savu cikla ilgumu, varat sākt testu 11 dienas pēc pirmā perioda, jo vidējais cikla ilgums ir 28 dienas. Veiciet 1 testu dienā 5 dienu pēr iedāvāt, vai, līdz novērojat krasu LH daudzuma paaugstināšanos.

CIKLA DIAGRAMMA

Cikla ilgums	Cikla diena, kad sākt testu	Cikla ilgums	Cikla diena, kad sākt testu
21 dienas	5. diena	31 dienas	15. diena
22 dienas	6. diena	32 dienas	16. diena
23 dienas	7. diena	33 dienas	17. diena
24 dienas	8. diena	34 dienas	18. diena
25 dienas	9. diena	35 dienas	19. diena
26 dienas	10. diena	36 dienas	20. diena
27 dienas	11. diena	37 dienas	21. diena
28 dienas	12. diena	38 dienas	22. diena
29 dienas	13. diena	39 dienas	23. diena
30 dienas	14. diena	40 dienas	24. diena

Piemērs: Ja jūsu cikls parasti ir divdesmit sešas dienas, tad cikla diagramma norāda, ka tests jāsāk 10. dienā. Šajā kalendārā parādīts, kā noteikt 10. dienu.

KALENDĀRA PARAUGS


1	2	3 + 1 diena	4	5	6	7
8	9	10	11	12 # 10. diena	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

3+ = Pirmā menstruālās asiņošanas diena

12# = Testa sākšanas diena (10. diena)

TESTA VEIKŠANA

- Pirms testēšanas testa strēmeli un urīnu jāuzglabā istabas temperatūrā.
- Izņemiet testa strēmeli no noslēgtā iepakojuma.
- Iemēciet testa strēmeli urīnā, lai bultīja būtu vērsta urīna virzienā. Pēc 3 sekundēm izņemiet testa strēmeli ārā un novietojiet to uz tārās, sausas un neuzsūcošas virsmas (kā, piemēram, uz urīna trauka atveres).



SVARĪGI! Nepielāujiet, lai urīna līmenis pārsniegtu atzīmi MAX, pretējā gadījumā tests netiks veikts pareizi.

- Pagaidet piecas minūtes un tad noslējet rezultātu. **Rezultātu pārbaudiet tieši 5 minūtes pēc tests veikšanas un ne vēlak!**

REZULTĀTU INTERPREĀCIJA

Negatīvs rezultāts (nav LH daudzuma palielināšanās):

- Kontroles zonā parādās tikai viena līnija;
- Līnija parādās gan kontroles zonā, gan testa zonā, bet tā ir gaišāka par kontroles līniju.

Tas nozīmē, ka nav bijusi LH daudzuma palielināšanās.

Pozitīvs rezultāts (ir LH daudzuma palielināšanās): ja ir redzamas divas krāsu līnijas, un testa josla ir tāda paša krāsa, kā kontroles josla, vai tumšāka - ir paredzams, ka nākamo 24-48 stundu laikā sāksies ovulācija. Ja censāties panākt grūtniecības iestāšanos, tad vislabākais laiks dzimummaktam ir 24 stundas (bet ne vēlāk kā 48 stundas) pēc pozitīva testa iznākuma.

Nederīgs rezultāts: pēc testa veikšanas nav redzama kontroles josla, vai arī tā ir redzama kontroles testa zonā, bet ne kontroles zonā. Atkārtojiet procedūru, izmantojot jaunu testa komplektu. Ja testa rezultāts joprojām ir nederīgs, sazinieties ar izplatītāju, norādot sērijas numuru.

TESTA IEROBEŽOJUMI

- Tests darbojas tikai tad, ja testa procedūra tiek ievērotā precīzi.
- Šo testu nevajadzētu izmantot kā kontracepcijas kontroles rīku.
- Ja jūsu cikls ir neregulārs, vai neierasti ilgs, lūdzu, sazinieties ar ārstu.
- Šis tests ir kvalitatīvs skrīninga tests. Tas nav paredzēts LH daudzumu koncentrācijas noteikšanai.
- Ierīce ir piemērota tikai cilvēku urīna analizei.
- Netiri paraugi vai traucējošas vielas urīnā var izraisīt kļūdainus rezultātus.
- Dažas zāles neauglības ārstēšanai, piemēram, 17 β-estradiola, Progesterona un Estradiola valerāts, var izraisīt kļūdainu rezultātu.
- Netiri testa ierīce var izraisīt nepatiess rezultātu.

FUNKCIONĀLIE RAKSTURIELUMI

PRECIZITĀTE

429 urīna paraugi tika pārbaudīti ar Wondfo vienpakāpes ovulācijas urīna testu un likumīgi tirgotu testu kliniskajā atsauces laboratorijā. Korelācija starp Wondfo One Step ovulācijas urīna testu un tirgotu laisto testu bija 99,8%. Pozitīva vienošanās ar pārdoto testu: 99,3% (144/145) Negatīvās vērtības un testētā testa rezultāts: 100% (284/284) Kopējā vienošanās ar pārdoto testu: 99,8% (428/429).

Jutīgums un precizitāte

MARIA BABY STRIP vienpakāpes urīna tests ovulācijas noteikšanai var noteikt Luteinīzējošo hormonu (LH) cilvēka urīnā, ja tas ir vairāk par 25 mIU/ml. Testu ir kalibrējis uzņēmums W.H.O. Standarts (2. PVO Starptautiskais standarts (IS) 80/552). Ja paraugā ir hFSH (200 mIU / ml) vai hTSH (250 mIU / L), nerodas krusteniska reakcija

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

- Ja ir liela krāsu atšķirība starp divu testu kontroles joslām, vai tas ir pamats bažām? Nē. Kontroles joslas krāsu atšķirības neieiek mērķeim testa rezultātu.
- Vai testa rezultāts var nolasīt vēlāk, nekā pēc 5 minūtēm? Nē. Testa rezultātu jānolasa tieši 5 minūtes pēc tā veikšanas. Kad arī pozitīvs rezultāts parasti nemainās vairākās dienas, negatīvs rezultāts var mainīties uz kļūdaini pozitīvu, pēc tam, kad pagājušas piecas minūtes pēc testēšanas perioda beigām, kā rezultātā mērķijums var nebūt korekts. Tāpēc vienmēr ieteicams testa rezultātus nolasīt 5 minūtē pēc tā veikšanas un tad testu izmesti, lai nerastos pārpratumi.
- Cik ilgi man būtu jāturpina veikt Maria Baby Strip testu? Vismaz 5 dienas, vai līdz tiek novērota krasa LH daudzuma palielināšanās.
- Testēšanas perioda laikā rezultātu zonā parādījās roža fona krāsa un vertikālās strīpas. Vai tas ir pamats bažām? Nē. Katrs urīna paraugs atšķiras pēc ķīmiskā sastāva, kā arī to ieteikmē gaisa mitrums testēšanas zonā (telpā). Šādas fīzikā apstākļu atšķirības var radīt vertikālās svītras un/vai rožā fona krāsu, neieiek mērķējot testa rezultātu.
- Vai alkoholis un bieži lietoti medikamenti var ieteikmēt testa iznākumu? Nē. Tomēr, ja lietojat kādas zāles, jums jākonsultējat ar ārstu.
- Iegūstot pozitīvu testa iznākumu, kad ir piemērotākais laiks dzimummaktam? Ovulācijai būtu jāsākas 24-48 stundu laikā. Šis laiks arī ir jums visauglīgais. Tāpēc dzimummaks ir ieteicams tieši šajā laika posmā.
- Es šobrīd izmantoju bazālās kermeņa temperatūras (BBT) metodi. Vai šīs tests var aizstāt BBT? Bazālās kermeņa temperatūras kāpums galvenokārt norāda uz to, ka ovulācija jau ir notikusi. Maria Baby Strip tests parāda kad ovulācija varētu notikti.
- Testa rezultāts bija pozitīvs un šo auglīgo dienu laikā man bija dzimummaks. Tomēr grūtniecība neiestājās. Ko man darīt? Grūtniecības iestāšanos var ieteikmēt virķe faktoru. Dažos gadījumos Maria Baby Strip testus var nākties lietot 3-4 mēnešus. Ja grūtniecība nav iestājusies pēc 3-4 mēnešiem, kopā ar savu partneri vēršeties pie ārsta.
- Vai rezultātu var ieteikmēt uzņemtā šķidruma daudzums? Apmēram divas stundas pirms urīna parauga savākšanas, iesakām ierobežot šķidruma uzņēšanu. Tas tāpēc, ka pastiprināta šķidruma uzņēšana pirms testa veikšanas atšķaidīs hormonu daudzumu jūsu urīnā.
- Izmantotie avoti
 - Siever LL, Dubois CA. "Validating signals of ovulation: Do women who think they know, really know?" Department of Anthropology, Machmer Hall, UMass Amherst, Amherst, Massachusetts. Am J Hum Biol. 2005 Apr 22;17(3):310-320
 - Ruiz Anguas J, Carballo Mondragon E, Anta Jaen E, Diaz Calvillo J, Kably Ambe A. "Usefulness of luteinizing hormone levels to determine the oocyte quality" Ginecol Obstet Mex. 2005 Jan; 73:28-35
- UZ IEPAKOJUMA ESOŠO SIMBOLU NOZĪME
- Ražotājs: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No.8, Lizihshan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, Ķīna.
- Sargājiet no saules stariem!
- Uzglabāt sausā vietā
- 4°C līdz 30°C
- Neizmantot atkārtoti
- Pilnvaretas pārīstāvis ES:
Qarad b.v.b.a., Cipalstraat 3, B-2440 GEEL, Belgium.
- Izplatītājs: SIA "ELVIM", Kurzemes prospekts 3G, Rīga LV-1067, Latvija. Tālr.: +371 67 808440.
- www.marialine.lv
- REF W2-S
- Revīzijas Numurs MBS 02.2020

